

Ayçiçeği Gübreleme Programı

Ayçiçeği için yıllık yapraktan besleme programı (Güncelleme 2022).

1. Uygulama Dönemi

Ekim Öncesi Toprak Hazırlığı

- Da / 2 L Aminado (8 çeşit serbest amino asit + organik madde)
- Da / 1 L Liquid S-80 (Sıvı kükürt (S formunda) toprak ıslahı)

Uygulamanın Amacı: Ekim öncesi toprak hazırlığında toprak yüzeyine püskürtme şeklinde yapılması önerilmektedir. Toprak organik maddesini iyileştirmek ve toprak pH dengesini sağlamaktır.

2. Uygulama Dönemi

(4-6 Yaprak Dönemi) (İlk Çapadan Sonra)

- Da / 150 cc Copperas (%5 Bakır Sülfat + organik asit + L-amino asitler)
- Da / 100 cc Activo (Organik + inorganik asit kompleksi pH düşürücü)
- Da / 100 cc Florista (5-20-0 + Çinko + Mangan)

Uygulamanın Amacı: İlk çapadan sonra bitki 4-6 yaprak dönemini geçtikten sonra yapılması önerilmektedir.

3. Uygulama Dönemi

(2. Çapadan Hemen Sonra)

- Da / 150 cc Copperas (%5 Bakır Sülfat + organik asit + L-amino asitler)
- Da / 200 cc Aminado (8 çeşit serbest amino asit + organik madde)
- Da / 100 cc Vital (5-11-11 + Mikro Element + Amino Asit)

4. Uygulama Dönemi

(Çiçek Öncesi Dönem)

- Da / 100 cc Copperas (%5 Bakır Sülfat + organik asit + L-amino asitler)
- Da / 200 cc Oceano Mix (Katkılı sıvı deniz yosunu + 17 amino asit)
- Da / 100 cc Vital (5-11-11 + Mikro Element + Amino Asit)

Programın Amacı

Bu program hazırlanırken toprak ve/veya yaprak analizi baz alınmadan, bitkinin sezon boyunca optimum ihtiyaç duyacağı makro ve mikro bitki besin elementlerinden oluşturulan karma yapraktan besleme programıdır. Program kapsamında önerilen tüm ürünler karışabilir olup, sırasına göre karıştırılmalıdır. Uygulama yapmadan önce kova testi yapılması önerilmektedir. Programlar tavsiye niteliğinde olup toprak veya yaprak analizlerine göre üzerinde değişiklik yapılabilir. Uygulamalardan doğacak sorumluluklar kullanıcıya aittir. Uygulamalar esnasında kullanılacak insektisit, akarisit ve fungisitler bakanlık tarafından tavsiye edilen ruhsatlı ürünler olmalıdır. AgroTroia üretimi dışında kullanılan

ürünlerin sorumlulukları kullanıcıya aittir.

Uyarılar

- Programda belirtilen ürünler sıralamaya göre (1-2-3-4, vb.) su ile karıştırılmalıdır.
- Uygulamanın akşam saatlerinde veya çiğ olmayan sabahlarda yapılması önerilmektedir.
- Uygulama yapıldıktan sonra ortalama 4 saat yağış olmaması gerekmektedir.
- İşbu besleme programı, izinsiz kopyalanamaz, amacı dışında kullanılamaz, alıntı yapılamaz.
- Agrotroia, iştiraklerine bildirmeksizin besleme programında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.