# Kayısı Gübreleme Programı

Kayısı için yıllık yapraktan besleme programı (Güncelleme 2026).

## 1 1. Uygulama Dönemi

Hasat Sonrası

- 100 L suya / 500 cc Copperas (%5 Bakır (Cu) — bakır sülfat)
- 100 L suya / 250 gr Combi (Kombine mikro element (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn))

Uygulamanın Amacı: Hasattan yorgun çıkan ağacın toparlanmasını desteklemek ve gelecek sezonun meyve gözlerinin beslenmesine katkı sağlamaktır.

## 2 2. Uygulama Dönemi

%50 Yaprak Dökümü Olunca

- 100 L suya / 500 cc Phosforico (0-9-11 PK gübre çözeltisi)
- 100 L suya / 500 cc Activo (Organik + inorganik asit kompleksi pH düşürücü)

Uygulamanın Amacı: Yaprak dökümü sürerken ağacın yedek besin depolamasını desteklemek ve kışa dengeli beslenmiş girmesini sağlamaktır.

## 3 3. Uygulama Dönemi

Yapraksız Dönemde

- 100 L suya / 1000 cc Copperas (%5 Bakır (Cu) — bakır sülfat)
- 100 L suya / 250 cc Phosforico (0-9-11 PK gübre çözeltisi)

Uygulamanın Amacı: Yapraksız dönemde ağacın kış şartlarına dengeli beslenmiş girmesine katkı sağlamaktır.

## 4 4. Uygulama Dönemi

Gözler Arı Gözü Şekline Gelince

- 100 L suya / 750 cc Copperas (%5 Bakır (Cu) — bakır sülfat)
- 100 L suya / 250 cc Phosforico (0-9-11 PK gübre çözeltisi)
- 100 L suya / 250 cc Activo (Organik + inorganik asit kompleksi pH düşürücü)

Uygulamanın Amacı: Uyanan gözleri besleyerek homojen ve kaliteli çiçek oluşumunu desteklemektir.

## 5 5. Uygulama Dönemi

%5 Çiçekte

- 100 L suya / 250 cc Activo (Organik + inorganik asit kompleksi pH düşürücü)
- 100 L suya / 250 cc Oceano Mix (Katkılı sıvı deniz yosunu (alginik asitli))

Uygulamanın Amacı: Çiçeklenme başlangıcında bitkiyi besleyerek dengeli çiçeklenmeyi ve meyve tutumunu desteklemektir.

## 6 6. Uygulama Dönemi

Tam Çiçeklenmede

- 100 L suya / 250 cc Activo (Organik + inorganik asit kompleksi pH düşürücü)
- 100 L suya / 250 cc Oceano Mix (Katkılı sıvı deniz yosunu (alginik asitli))

Uygulamanın Amacı: Tam çiçeklenme döneminde bitkinin stres altında kalmadan sağlıklı meyve tutumunu desteklemektir.

## 7 7. Uygulama Dönemi

Tane Gösterince

- 100 L suya / 250 cc Activo (Organik + inorganik asit kompleksi pH düşürücü)
- 100 L suya / 250 cc Oceano Mix (Katkılı sıvı deniz yosunu (alginik asitli))
- 100 L suya / 250 cc Calcio (Kalsiyum (CaO) + Nitrat Azotu (N))

Uygulamanın Amacı: Meyve tutumu sonrası tane gelişimini ve kalsiyum ile meyve dokusunun sağlamlığını desteklemektir.

## 8 8. Uygulama Dönemi

Önceki Uygulamadan 7-10 Gün Sonra

- 100 L suya / 250 cc Copperas (%5 Bakır (Cu) — bakır sülfat)
- 100 L suya / 250 cc Aminado (8 çeşit serbest amino asit + organik madde)
- 100 L suya / 250 gr Combi (Kombine mikro element (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn))
- 100 L suya / 250 cc Vital (5-11-11 + Mikro Element)

Uygulamanın Amacı: Hızlı büyüme döneminde meyve ve sürgün gelişimini amino asit ve mikro elementlerle desteklemektir.

## 9 9. Uygulama Dönemi

Önceki Uygulamadan 7-10 Gün Sonra

- 100 L suya / 250 cc Copperas (%5 Bakır (Cu) — bakır sülfat)
- 100 L suya / 250 cc Vital (5-11-11 + Mikro Element)
- 100 L suya / 250 cc Calcio (Kalsiyum (CaO) + Nitrat Azotu (N))
- 100 L suya / 250 gr SuperDrop 20-0-28 (20-0-28 + %2 MgO)

Uygulamanın Amacı: Meyve iriliği, renklenme ve kalitesini potasyum ve kalsiyum ile desteklemektir.

## Programın Amacı

Bu program hazırlanırken toprak ve/veya yaprak analizi baz alınmadan, bitkinin sezon boyunca optimum ihtiyaç duyacağı makro ve mikro bitki besin elementlerinden oluşturulan karma yapraktan besleme programıdır. Program kapsamında önerilen tüm ürünler karışabilir olup, sırasına göre karıştırılmalıdır. Uygulama yapmadan önce kova testi yapılması önerilmektedir. Programlar tavsiye niteliğinde olup toprak veya yaprak analizlerine göre üzerinde değişiklik yapılabilir. Uygulamalardan doğacak sorumluluklar kullanıcıya aittir. Uygulamalar esnasında kullanılacak insektisit, akarisit ve fungisitler bakanlık tarafından tavsiye edilen ruhsatlı ürünler olmalıdır. Agrotroia üretimi dışında kullanılan ürünlerin sorumlulukları kullanıcıya aittir.

## Uyarılar

- Programda belirtilen ürünler sıralamaya göre (1-2-3-4, vb.) su ile karıştırılmalıdır.
- Uygulamanın akşam saatlerinde veya çiğ olmayan sabahlarda yapılması önerilmektedir.
- Uygulama yapıldıktan sonra ortalama 4 saat yağış olmaması gerekmektedir.
- İşbu besleme programı, izinsiz kopyalanamaz, amacı dışında kullanılamaz, alıntı yapılamaz.
- Agrotroia, iştiraklerine bildirmeksizin besleme programında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.