

Muz Gübreleme Programı

Muz için yıllık yapraktan besleme programı (Güncelleme 2022).

1. Uygulama Dönemi

(Nisan İlk Haftası)

- 100 L Suya / 500 cc Copperas (%5 Bakır Sülfat + organik asit + L-amino asitler)
- 100 L suya / 250 cc NitroZinc (15-0-0 + Çinko + Demir)
- 100 L suya / 250 g B-Zinc (Bor %11 + Çinko %8 + Mangan %2)

Not: Kırmızı Örümcek, Yaprak Biti, Nematod (%15'in Üzerindeyse) Tespit ve Mücadelesi.

2. Uygulama Dönemi

(Mayıs - Haziran Aylarında)

- 100 L Suya / 350 cc Florista (5-20-0 + Çinko + Mangan)
- 100 L Suya / 350 gr Combi (Şelatlı kombine mikro element (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn))
- 100 L Suya / 350 cc Oceano Mix (Katkılı sıvı deniz yosunu + 17 amino asit)

3. Kök Çürüklüğü Olan Yerler İçin

(Mayıs - Haziran Aylarında)

- 100 L Suya: 4 L Copperas (%5 Bakır Sülfat + organik asit + L-amino asitler)
- 1,5 L Activo (Organik + inorganik asit kompleksi pH düşürücü)
- 1 L Phosforico (0-9-11 fosfit esaslı)

Uygulamanın Amacı: Karıştırılıp fidan başı 400 cc gelecek şekilde uygulanır. Kök çürüklüğü görülmeyen yerlerde normal programa devam edilir.

4. Uygulama Dönemi

Temmuz - Ağustos

- 100 L Suya / 250 cc Activo (Organik + inorganik asit kompleksi pH düşürücü)
- 100 L Suya / 250 gr SuperDrop 20-0-28 (20-0-28 + %2 MgO)

Programın Amacı

Bu program hazırlanırken toprak ve/veya yaprak analizi baz alınmadan, bitkinin sezon boyunca optimum ihtiyaç duyacağı makro ve mikro bitki besin elementlerinden oluşturulan karma yapraktan besleme programıdır. Program kapsamında önerilen tüm ürünler karışabilir olup, sırasına göre karıştırılmalıdır. Uygulama yapmadan önce kova testi yapılması önerilmektedir. Programlar tavsiye niteliğinde olup toprak veya yaprak analizlerine göre üzerinde değişiklik yapılabilir. Uygulamalardan doğacak sorumluluklar kullanıcıya aittir. Uygulamalar esnasında kullanılacak insektisit, akarisit ve fungusitler bakanlık tarafından tavsiye edilen ruhsatlı ürünler olmalıdır. AgroTroia üretimi dışında kullanılan ürünlerin sorumlulukları kullanıcıya aittir.

Uyarılar

- Programda belirtilen ürünler sıralamaya göre (1-2-3-4, vb.) su ile karıştırılmalıdır.
- Uygulamanın akşam saatlerinde veya çiğ olmayan sabahlarda yapılması önerilmektedir.
- Uygulama yapıldıktan sonra ortalama 4 saat yağış olmaması gerekmektedir.
- İşbu besleme programı, izinsiz kopyalanamaz, amacı dışında kullanılamaz, alıntı yapılamaz.
- Agrotroia, iştiraklerine bildirmeksizin besleme programında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.