Pamuk Gübreleme Programı

Pamuk için yıllık yapraktan besleme programı (Güncelleme 2022).

1 Toprak Hazırlığı

Ekim Öncesi

- Da / 2 L Liquid S-80 (Sıvı kükürt (S formunda) toprak ıslahı)

Uygulamanın Amacı: Ekim öncesi toprak hazırlığında toprak yüzeyine püskürtme şeklinde yapılması önerilmektedir. Toprak pH dengesini sağlamaktır.

2 1. Uygulama Dönemi

(Pamuk 15 cm Olunca)

- Da / 200 cc Copperas (%5 Bakır (Cu) — bakır sülfat)
- Da / 150 cc Florista (5-20-0 + Çinko + Mangan)
- Da / 200 cc Aminado (8 çeşit serbest amino asit + organik madde)

Not: Bu dönemde trips, kırmızı örümcek mücadelesi yapılmalıdır.

3 2. Uygulama Dönemi

(Çiçek Başlangıcı)

- Da / 100 cc Activo (Organik + inorganik asit kompleksi pH düşürücü)
- Da / 100 gr Fors 0-15-30 (0-15-30 PK (harmanlanmış))
- Da / 100 cc Oceano Mix (Katkılı sıvı deniz yosunu (alginik asitli))

Not: Bu dönemde yeşil kurt, psila mücadelesi yapılmalıdır.

4 3. Uygulama Dönemi

(Koza Oluşturma Dönemi)

- 100 gr B-Zinc (Bor %11 + Çinko %8 + Mangan %2)
- 200 cc Calcio (Kalsiyum (CaO) + Nitrat Azotu (N))
- 100 cc Oceano Mix (Katkılı sıvı deniz yosunu (alginik asitli))

Not: Bu dönemde pamuk çizgili yaprak kurdu ve yeşil kurt mücadelesi yapılmalıdır.

Programın Amacı

Bu program hazırlanırken toprak ve/veya yaprak analizi baz alınmadan, bitkinin sezon boyunca optimum ihtiyaç duyacağı makro ve mikro bitki besin elementlerinden oluşturulan karma yapraktan besleme programıdır. Program kapsamında önerilen tüm ürünler karışabilir olup, sırasına göre karıştırılmalıdır. Uygulama yapmadan önce kova testi yapılması önerilmektedir. Programlar tavsiye niteliğinde olup toprak veya yaprak analizlerine göre üzerinde değişiklik yapılabilir. Uygulamalardan doğacak sorumluluklar kullanıcıya aittir. Uygulamalar esnasında kullanılacak insektisit, akarisit ve fungisitler bakanlık tarafından tavsiye edilen ruhsatlı ürünler olmalıdır. Agrotroia üretimi dışında kullanılan

ürünlerin sorumlulukları kullanıcıya aittir.

Uyarılar

- Programda belirtilen ürünler sıralamaya göre (1-2-3-4, vb.) su ile karıştırılmalıdır.
- Uygulamanın akşam saatlerinde veya çiğ olmayan sabahlarda yapılması önerilmektedir.
- Uygulama yapıldıktan sonra ortalama 4 saat yağış olmaması gerekmektedir.
- İşbu besleme programı, izinsiz kopyalanamaz, amacı dışında kullanılamaz, alıntı yapılamaz.
- Agrotroia, iştiraklerine bildirmeksizin besleme programında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.