

Sebze Yetiştiriciliği (Genel) Gübreleme Programı

Sera ve açık alan sebzeleri için dikimden hasada yaprak + damla besleme programı.

1

1. Uygulama — Dikim / Can Suyu

Damla sulamadan, can suyuyla birlikte

- 1 L / da (damla) Copperas (%5 Bakır (Cu) — bakır sülfat)
- 1 L / da (damla) Aminado (8 çeşit serbest amino asit + organik madde)

Uygulamanın Amacı: Fidenin toprağa tutunması ve sağlıklı bir başlangıç için kök bölgesinden besleme.

2

2. Uygulama — Fideler Şaşırtıldıktan Sonra

Fide toprağa tutunduktan sonra — 1 uygulama (yapraktan)

- 100 L suya / 250 cc Copperas (%5 Bakır (Cu) — bakır sülfat)
- 100 L suya / 250 cc Aminado (8 çeşit serbest amino asit + organik madde)

Uygulamanın Amacı: Şaşırtma sonrası fidenin gelişiminin ve beslenme dengesinin desteklenmesi.

3

3. Uygulama — Çiçek Dönemine Kadar

2. uygulamadan 10 gün sonra (yaprak + damla)

- 100 L suya / 250 cc Copperas (%5 Bakır (Cu) — bakır sülfat)
- 100 L suya / 250 cc Oceano Mix (Katkılı sıvı deniz yosunu (alginik asitli))
- 100 L suya / 250 cc Florista (5-20-0 + Çinko + Mangan)
- 2 L / da (damla) Calcio (Kalsiyum (CaO) + Nitrat Azotu (N))
- 1 L / da (damla) Oceano Mix (Katkılı sıvı deniz yosunu (alginik asitli))

Uygulamanın Amacı: Çiçeklenme öncesi vejetatif gelişimin, kök faaliyetinin ve kalsiyum beslenmesinin desteklenmesi.

4

4. Uygulama — İlk Çiçekler Görülünce

Çiçeklenme başlangıcı (yapraktan)

- 100 L suya / 100 cc Phosforico (0-9-11 PK gübre çözeltisi)
- 100 L suya / 250 cc Combi (Kombine mikro element (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn))
- 100 L suya / 250 cc Calcio (Kalsiyum (CaO) + Nitrat Azotu (N))
- 100 L suya / 250 cc Aminado (8 çeşit serbest amino asit + organik madde)

Uygulamanın Amacı: Çiçeklenme ve döllenme döneminde fosfor, kalsiyum ve mikro element ihtiyacının karşılanması.

5

5. Uygulama — İlk Meyveler Görölünce

Meyve tutumu başlangıcı (yapraktan)

- 100 L suya / 250 cc Copperas (%5 Bakır (Cu) — bakır sülfat)
- 100 L suya / 250 cc Calcio (Kalsiyum (CaO) + Nitrat Azotu (N))
- 100 L suya / 250 cc Vital (5-11-11 + Mikro Element)
- 100 L suya / 250 cc Oceano Mix (Katkılı sıvı deniz yosunu (alginik asitli))

Uygulamanın Amacı: Meyve tutumu döneminde dengeli beslenme; meyve kalitesi ve doku sağlamlığının desteklenmesi.

6

6. Uygulama — İlk Meyveden 1 Hafta Sonra

Meyve gelişimi (yapraktan)

- 100 L suya / 250 cc Copperas (%5 Bakır (Cu) — bakır sülfat)
- 100 L suya / 250 cc Vital (5-11-11 + Mikro Element)

Uygulamanın Amacı: Meyve gelişim döneminde beslenmenin sürdürülmesi.

7

7. Uygulama — Hasat Süreci Boyunca

2. haftadan itibaren, hasat boyunca devam eden uygulama (yaprak + damla)

- 100 L suya / 100 cc Phosforico (0-9-11 PK gübre çözeltisi)
- 100 L suya / 250 cc SuperDrop 20-0-28 (20-0-28 + %2 MgO)
- 100 L suya / 250 cc Aminado (8 çeşit serbest amino asit + organik madde)
- 2 kg / da (damla) SuperDrop 20-0-28 (20-0-28 + %2 MgO)

Uygulamanın Amacı: Hasat dönemi boyunca potasyum ağırlıklı besleme ile meyve iriliği, renk ve kalite sürekliliğinin desteklenmesi.

8

8. Uygulama — Dayanıklılık Desteği

Stres ve hastalık baskısının arttığı dönemlerde — 1 hafta arayla 2 uygulama (yapraktan)

- 100 L suya / 200 cc Activo (Organik + inorganik asit kompleksi pH düşürücü)
- 100 L suya / 100 cc Phosforico (0-9-11 PK gübre çözeltisi)

Uygulamanın Amacı: Bitkinin doğal yapısal dayanıklılığının ve genel kondisyonunun desteklenmesi.

Not: Bu program bitki besleme amaçlıdır; bitki koruma ürünlerinin (ilaçların) yerine geçmez. Karışım öncesi kova (uyumluluk) testi önerilir.

Programın Amacı

Bu program hazırlanırken toprak ve/veya yaprak analizi baz alınmadan, bitkinin sezon boyunca optimum ihtiyaç duyacağı makro ve mikro bitki besin elementlerinden oluşturulan karma yapraktan besleme programıdır. Program kapsamında önerilen tüm ürünler karışabilir olup, sırasına göre karıştırılmalıdır. Uygulama yapmadan önce kova testi yapılması önerilmektedir. Programlar tavsiye niteliğinde olup toprak veya yaprak analizlerine göre üzerinde değişiklik yapılabilir. Uygulamalardan doğacak sorumluluklar kullanıcıya aittir. Uygulamalar esnasında kullanılacak insektisit, akarisit ve fungusitler bakanlık tarafından tavsiye edilen ruhsatlı ürünler olmalıdır. Agrotroia üretimi dışında kullanılan ürünlerin sorumlulukları kullanıcıya aittir.

Uyarılar

- Programda belirtilen ürünler sıralamaya göre (1-2-3-4, vb.) su ile karıştırılmalıdır.
- Uygulamanın akşam saatlerinde veya çiğ olmayan sabahlarda yapılması önerilmektedir.
- Uygulama yapıldıktan sonra ortalama 4 saat yağış olmaması gerekmektedir.
- İşbu besleme programı, izinsiz kopyalanamaz, amacı dışında kullanılamaz, alıntı yapılamaz.
- Agrotroia, iştiraklerine bildirmeksizin besleme programında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.