

Yer Fıstığı Gübreleme Programı

Yer fıstığında 3 yaprak, iğne atma ve iç dolum dönemleri için dekara dozlu yapraktan besleme programı.

1

1. Uygulama Dönemi

(3 Yaprak Dönemi)

- Dekara 150 cc Copperas (%5 Bakır (Cu) — bakır sülfat)
- Dekara 100 gr B-Zinc (Bor %11 + Çinko %8 + Mangan %2)
- Dekara 100 cc Vital (5-11-11 + Mikro Element)

Uygulamanın Amacı: Çıkış sonrası ilk gelişme döneminde bitkinin hızlı ve dengeli bir vejetatif gelişim göstermesi hedeflenir. Copperas, bakır ve organik asit içeriğiyle fungal hastalık baskısını azaltırken; B-Zinc'in bor-çinko-mangan içeriği kök ve sürgün gelişimini destekler. Vital ise aminoasit destekli NPK içeriğiyle genç bitkinin besin ihtiyacını karşılar.

2

2. Uygulama Dönemi

(İğne Atma Dönemi)

- Dekara 100 cc Activo (Organik + inorganik asit kompleksi pH düşürücü)
- Dekara 200 cc Florista (5-20-0 + Çinko + Mangan)
- Dekara 100 cc Calcio (Kalsiyum (CaO) + Nitrat Azotu (N))

Uygulamanın Amacı: İğne atma (ginofor oluşumu) döneminde çiçeklenmenin düzenli olması ve iğnelerin toprağa sağlıklı girmesi amaçlanır. Florista, fosfor-çinko-mangan içeriğiyle çiçek oluşumunu ve generatif gelişimi destekler. Calcio, hücre duvarını güçlendirerek iğnelerin kırılmadan toprağa ulaşmasına yardımcı olur. Activo ise tank karışımının pH'ını düzenleyip yayıcı-yapıştırıcı etkisiyle uygulamanın etkinliğini artırır.

3

3. Uygulama Dönemi

(İç Dolum Dönemi)

- Dekara 100 cc Vital (5-11-11 + Mikro Element)
- Dekara 100 cc Aminado (8 çeşit serbest amino asit + organik madde)
- Dekara 100 gr SuperDrop 20-0-28 (20-0-28 + %2 MgO)

Uygulamanın Amacı: İç dolum döneminde danenin dolgunlaşması ve kalibrenin artması hedeflenir. SuperDrop 20-0-28'in yüksek potasyum içeriği dane dolumunu ve iç kalitesini doğrudan destekler. Aminado, dolum dönemindeki stresin hızla atlatılmasını sağlarken; Vital dengeli NPK içeriğiyle bitkinin hasada kadar yeşil kalmasına yardımcı olur.

Programın Amacı

Bu program hazırlanırken toprak ve/veya yaprak analizi baz alınmadan, bitkinin sezon boyunca optimum ihtiyaç duyacağı makro ve mikro bitki besin elementlerinden oluşturulan karma yapraktan besleme programıdır. Program kapsamında önerilen tüm ürünler karışabilir olup, sırasına göre karıştırılmalıdır. Uygulama yapmadan önce kova testi yapılması önerilmektedir. Programlar tavsiye niteliğinde olup toprak veya yaprak analizlerine göre üzerinde değişiklik yapılabilir. Uygulamalardan doğacak sorumluluklar kullanıcıya aittir. Uygulamalar esnasında kullanılacak insektisit, akarisit ve fungusitler bakanlık tarafından tavsiye edilen ruhsatlı ürünler olmalıdır. Agrotroia üretimi dışında kullanılan ürünlerin sorumlulukları kullanıcıya aittir.

Uyarılar

- Programda belirtilen ürünler sıralamaya göre (1-2-3-4, vb.) su ile karıştırılmalıdır.
- Uygulamanın akşam saatlerinde veya çiğ olmayan sabahlarda yapılması önerilmektedir.
- Uygulama yapıldıktan sonra ortalama 4 saat yağış olmaması gerekmektedir.
- İşbu besleme programı, izinsiz kopyalanamaz, amacı dışında kullanılamaz, alıntı yapılamaz.
- Agrotroia, iştiraklerine bildirmeksizin besleme programında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.