Yonca Gübreleme Programı

Yonca için her biçim sonrası yapraktan besleme programı: dekara 100 cc Vital, 100 cc Aminado ve 100 cc Activo.

1 1. Uygulama Dönemi

(Mayıs) İlk Biçim Sonrası

- Dekara 100 cc Vital (5-11-11 + Mikro Element)
- Dekara 100 cc Aminado (8 çeşit serbest amino asit + organik madde)
- Dekara 100 cc Activo (Organik + inorganik asit kompleksi pH düşürücü)

Uygulamanın Amacı: İlk biçimin ardından bitkinin biçim stresini hızla atlatması ve yeni sürgünlerin güçlü çıkması hedeflenir. Aminado'nun serbest aminoasitleri kök gelişimini ve yeniden sürgün oluşumunu destekler; Vital'in aminoasit destekli NPK içeriği hızlı ve dengeli bir vejetatif gelişim sağlar. Activo ise tank karışımının pH'ını düzenler, yayıcı-yapıştırıcı etkisiyle uygulamanın etkinliğini artırır.

Not: Uygulama, biçimden sonra yeni sürgünler görülmeye başladığında (yaklaşık 8-10 cm) günün serin saatlerinde yapraktan yapılmalıdır.

2 2. Uygulama Dönemi

(Haziran - Ağustos) Yaz Biçimleri Sonrası

- Dekara 100 cc Vital (5-11-11 + Mikro Element)
- Dekara 100 cc Aminado (8 çeşit serbest amino asit + organik madde)
- Dekara 100 cc Activo (Organik + inorganik asit kompleksi pH düşürücü)

Uygulamanın Amacı: Yaz aylarında biçim sıklığı artar ve bitki sıcaklık stresine maruz kalır. Her biçim sonrası yapılan bu uygulamada Vital, güneş yanığına ve renk kaybına karşı koruma sağlarken; Aminado, biçim ve sıcaklık stresinin hızla atlatılmasına yardımcı olur. Activo, sıcak ve kurak koşullarda uygulama suyunun kalitesini düzelterek ürünlerin yaprağa tutunmasını güçlendirir.

Not: Yaz döneminde uygulama sabah erken veya akşam serin saatlerde yapılmalı, öğle sıcağında uygulamadan kaçınılmalıdır.

3 3. Uygulama Dönemi

(Eylül - Ekim) Son Biçimler ve Kışa Hazırlık

- Dekara 100 cc Vital (5-11-11 + Mikro Element)
- Dekara 100 cc Aminado (8 çeşit serbest amino asit + organik madde)
- Dekara 100 cc Activo (Organik + inorganik asit kompleksi pH düşürücü)

Uygulamanın Amacı: Sezonun son biçimlerinden sonra yapılan uygulama, bitkinin kök boğazında besin rezervi oluşturarak kışa güçlü girmesini sağlar. Aminado kök gelişimini destekleyerek kış dayanımını artırır; Vital dengeli NPK içeriğiyle biçim sonrası toparlanmayı hızlandırır. Activo uygulama etkinliğini artırır.

Not: Kışa girmeden önceki son biçimin çok geç yapılmaması, bitkinin kış öncesi yeterli rezerv oluşturmasına imkân tanır.

Programın Amacı

Bu program hazırlanırken toprak ve/veya yaprak analizi baz alınmadan, bitkinin sezon boyunca optimum ihtiyaç duyacağı makro ve mikro bitki besin elementlerinden oluşturulan karma yapraktan besleme programıdır. Program kapsamında önerilen tüm ürünler karışabilir olup, sırasına göre karıştırılmalıdır. Uygulama yapmadan önce kova testi yapılması önerilmektedir. Programlar tavsiye niteliğinde olup toprak veya yaprak analizlerine göre üzerinde değişiklik yapılabilir. Uygulamalardan doğacak sorumluluklar kullanıcıya aittir. Uygulamalar esnasında kullanılacak insektisit, akarisit ve fungisitler bakanlık tarafından tavsiye edilen ruhsatlı ürünler olmalıdır. Agrotroia üretimi dışında kullanılan ürünlerin sorumlulukları kullanıcıya aittir.

Uyarılar

- Programda belirtilen ürünler sıralamaya göre (1-2-3-4, vb.) su ile karıştırılmalıdır.
- Uygulamanın akşam saatlerinde veya çiğ olmayan sabahlarda yapılması önerilmektedir.
- Uygulama yapıldıktan sonra ortalama 4 saat yağış olmaması gerekmektedir.
- İşbu besleme programı, izinsiz kopyalanamaz, amacı dışında kullanılamaz, alıntı yapılamaz.
- Agrotroia, iştiraklerine bildirmeksizin besleme programında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.