Yumuşak Çekirdekli Meyveler Gübreleme Programı

Yumuşak Çekirdekli Meyveler için yıllık yapraktan besleme programı (Güncelleme 2025).

1 1. Uygulama Dönemi

Hasattan Sonra

- 100 L suya / 500 cc Copperas (%5 Bakır (Cu) — bakır sülfat)
- 100 L suya / 250 cc Phosforico (0-9-11 PK gübre çözeltisi)

Uygulamanın Amacı: Hasat sonrası bitkiyi dezenfekte edip yeni sezon için meyve gözlerini hazırlamaktır.

2 2. Uygulama Dönemi

Yapraklar Dökülünce

- 100 L suya / 1000 cc Copperas (%5 Bakır (Cu) — bakır sülfat)

Uygulamanın Amacı: Yapraksız döneme giren bitkiyi kış şartlarından korumak için yapılan bir uygulamadır.

3 3. Uygulama Dönemi

Meyve Gözleri Kabarınca

- 100 L suya / 250 cc Copperas (%5 Bakır (Cu) — bakır sülfat)
- 100 L suya / 250 cc Phosforico (0-9-11 PK gübre çözeltisi)
- 100 L Suya / 250 cc Oceano Mix (Katkılı sıvı deniz yosunu (alginik asitli))

4 4. Uygulama Dönemi

Çiçek Öncesi

- 100 L suya / 250 g Florista (5-20-0 + Çinko + Mangan)
- 100 L suya / 250 cc Activo (Organik + inorganik asit kompleksi pH düşürücü)
- 100 L suya / 250 cc Oceano Mix (Katkılı sıvı deniz yosunu (alginik asitli))

Uygulamanın Amacı: Bzinc Bor Çinko Mangan çiçeklenmeye teşvik eder. Sıvı deniz yosunu gece gündüz sıcaklık farkından dolayı oluşan stresi engeller.

5 5. Uygulama Dönemi

Çiçek Sonrası

- 100 L suya / 250 cc Copperas (%5 Bakır (Cu) — bakır sülfat)
- 100 L suya / 250 cc Calcio (Kalsiyum (CaO) + Nitrat Azotu (N))
- 100 L suya / 250 cc Aminado (8 çeşit serbest amino asit + organik madde)

6 6. Uygulama Dönemi

5. Uygulamadan 7-10 Gün Sonra

- 100 L suya / 250 cc Copperas (%5 Bakır (Cu) — bakır sülfat)
- 100 L suya / 250 cc Vital (5-11-11 + Mikro Element)
- 100 L suya / 250 cc Aminado (8 çeşit serbest amino asit + organik madde)

Programın Amacı

Bu program hazırlanırken toprak ve/veya yaprak analizi baz alınmadan, bitkinin sezon boyunca optimum ihtiyaç duyacağı makro ve mikro bitki besin elementlerinden oluşturulan karma yapraktan besleme programıdır. Program kapsamında önerilen tüm ürünler karışabilir olup, sırasına göre karıştırılmalıdır. Uygulama yapmadan önce kova testi yapılması önerilmektedir. Programlar tavsiye niteliğinde olup toprak veya yaprak analizlerine göre üzerinde değişiklik yapılabilir. Uygulamalardan doğacak sorumluluklar kullanıcıya aittir. Uygulamalar esnasında kullanılacak insektisit, akarisit ve fungisitler bakanlık tarafından tavsiye edilen ruhsatlı ürünler olmalıdır. Agrotroia üretimi dışında kullanılan ürünlerin sorumlulukları kullanıcıya aittir.

Uyarılar

- Programda belirtilen ürünler sıralamaya göre (1-2-3-4, vb.) su ile karıştırılmalıdır.
- Uygulamanın akşam saatlerinde veya çiğ olmayan sabahlarda yapılması önerilmektedir.
- Uygulama yapıldıktan sonra ortalama 4 saat yağış olmaması gerekmektedir.
- İşbu besleme programı, izinsiz kopyalanamaz, amacı dışında kullanılamaz, alıntı yapılamaz.
- Agrotroia, iştiraklerine bildirmeksizin besleme programında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.